

日医発第73号（保15）  
平成22年4月26日

都道府県医師会長 殿

日本医師会長  
原中勝征

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について

平成22年4月16日付厚生労働省告示第196号をもって薬価基準の一部が改正され、告示の日から適用されました。

今回の改正は、薬事法の規定に基づき承認を得た新医薬品で、薬価基準に掲載希望のあった10成分13品目を、薬価基準の別表に第5部追補(1)として掲載したものであります。

つきましては、今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。

本件につきましては、日本医師会雑誌6月号に掲載を予定しております。

(添付資料)

1. 官報（平22. 4. 16 第5295号抜粋）
2. 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について  
（平22. 4. 16 厚生労働省保険局医療課事務連絡）

(参 考)

1. 薬価基準掲載希望品目一覧表（薬効分類別）新医薬品（平成22年1月承認分）



編集・印刷  
独立行政法人国立印刷局

目次

(告示)

○使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件(厚生労働一九六)

品名	規格	単位	薬価 円
(1) 追 補			
第 5 部 内	品 名	規 格	単 位
(あ)	アフィニトール錠 5mg		5 mg 1 錠
(え)	エクア錠 50mg		50mg 1 錠
	エックスフォージ配合錠		1 錠
(さ)	サインバルタカプセル 20mg		20mg 1 カプセル
	サインバルタカプセル 30mg		30mg 1 カプセル
(め)	㊦ メトグルコ錠 250mg		250mg 1 錠
(れ)	レザルタス配合錠 HD		1 錠
	レザルタス配合錠 LD		1 錠
注 射	品 名	規 格	単 位
(あ)	アロキシ静注 0.75mg		0.75mg 5 mL 1 瓶
(て)	テモダール点滴静注用 100mg		100mg 1 瓶
(ふ)	プリディオン静注 200mg		200mg 2 mL 1 瓶
	プリディオン静注 500mg		500mg 5 mL 1 瓶
外 用	品 名	規 格	単 位
(さ)	ザラカム配合点眼液		1 mL

○厚生労働省告示第九十六号  
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の一部を次のように改正する。  
平成二十二年四月十六日  
別表に第 5 部として次のように加える。  
厚生労働大臣 長妻 昭



事務連絡  
平成22年4月16日

地方厚生（支）局医療課  
都道府県民生主管部（局）  
国民健康保険主管課（部）  
都道府県後期高齢者医療主管部（局）  
後期高齢者医療主管課（部）

御中

厚生労働省保険局医療課

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）については、本日、平成22年厚生労働省告示第196号をもって改正されたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

- 1 薬事法（昭和35年法律第145号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への掲載希望があった医薬品（内用薬8品目、注射薬4品目及び外用薬1品目）について、薬価基準の別表に掲載したものであること。
- 2 1により薬価基準の別表に掲載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	8,684	4,014	2,734	36	15,468

( 参 考 )

## 薬価基準告示

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価(円)
1	内用薬 アフィニトール錠 5mg	エベロリムス	5mg 1錠	12,711.10
2	内用薬 エクア錠50mg	ビルダグリプチン	50mg 1錠	104.70
3	内用薬 エックスフォージ配合錠	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	130.10
4	内用薬 サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩	20mg 1カプセル	169.30
5	内用薬 サインバルタカプセル30mg	デュロキセチン塩酸塩	30mg 1カプセル	230.50
6	内用薬 ㊦メトグルコ錠250mg	メトホルミン塩酸塩	250mg 1錠	9.90
7	内用薬 レザルタス配合錠HD	オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン	1錠	170.10
8	内用薬 レザルタス配合錠LD	オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン	1錠	91.00
9	注射薬 アロキシ静注0.75mg	パロノセトロン塩酸塩	0.75mg 5mL 1瓶	14,522
10	注射薬 テモダール点滴静注用100mg	テモゾロミド	100mg 1瓶	36,794
11	注射薬 プリディオン静注200mg	スガマデクスナトリウム	200mg 2mL 1瓶	9,947
12	注射薬 プリディオン静注500mg	スガマデクスナトリウム	500mg 5mL 1瓶	23,652
13	外用薬 ザラカム配合点眼液	ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	1mL	1,306.00

# (参 考)

薬価基準収載希望品目一覧表 (薬効分類別)

新医薬品 (平成二十二年一月承認分)

## (内用薬)

1	薬効分類	銘柄名 (会社名)	規格単位	成分名	用法・用量
	内117	サインシタカプセル 20mg サインシタカプセル 30mg (塩野義製薬)	20mg1 カプセル 30mg1 カプセル	デュロキセチン 塩酸塩	通常、成人には1日1回朝食後、デュロキセチンとして40mgを経口投与する。投与は1日20mgより開始し、1週間以上の間隔を空けて1日用量として20mgずつ増量する。なお、効果不十分な場合には、1日60mgまで増量することができる。
		(効能・効果) うつ病・うつ状態			

2	薬効分類	銘柄名 (会社名)	規格単位	成分名	用法・用量
	内214	エックスフォージ配合錠 (ノバルティス ファーマ)	1錠	バルサルタン・ アムロジピンベ シル酸塩	成人には1日1回1錠(バルサルタンとして80mg及びアムロジピンとして5mg)を経口投与する。本剤は高血圧治療の第一選択薬として用いない。
		(効能・効果) 高血圧症			

3	薬効分類	銘柄名 (会社名)	規格単位	成分名	用法・用量
	内214	レザルタス配合錠LD レザルタス配合錠HD (第一三共)	1錠 1錠	オルメサルタン メド キシミル/アゼル ニジピン	通常、成人には1日1回1錠(オルメサルタン メドキシミル/アゼルニジピンとして10mg/8mg又は20mg/16mg)を朝食後経口投与する。本剤は高血圧治療の第一選択薬として用いない。
		(効能・効果) 高血圧症			

薬効分類	銘柄名 (会社名)	規格単位	成分名	用法・用量
4	内396 エクア錠 (ノバルティス ファーマ)	50mg 1錠	ビルダグリプチン	通常、成人では、ビルダグリプチンとして50mgを1日2回朝、夕に経口投与する。なお患者の状態に応じて50mgを1日1回朝に投与することができる。
(効能・効果) 2型糖尿病 ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られない場合に限る。 ①食事療法、運動療法のみ ②食事療法、運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用				

薬効分類	銘柄名 (会社名)	規格単位	成分名	用法・用量
5	内396 ㊦メトグルコ錠250mg (大日本住友製薬)	250mg 1錠	メトホルミン塩酸塩	通常、成人にはメトホルミン塩酸塩として1日500mgより開始し、1日2～3回に分割して食直前又は食後に経口投与する。維持量は効果を観察しながら決めるが、通常1日750～1500mgとする。なお、患者の状態により適宜増減するが、1日最高投与量は2250mgまでとする。
(効能・効果) 2型糖尿病 ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られない場合に限る。 (1) 食事療法・運動療法のみ (2) 食事療法・運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用				

薬効分類	銘柄名 (会社名)	規格単位	成分名	用法・用量
6	内429 アフィニトール錠5mg (ノバルティス ファーマ)	5mg 1錠	エベロリムス	通常、成人にはエベロリムスとして1日1回10mgを空腹時に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。
(効能・効果) 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌				

## (注射薬)

薬効分類	銘柄名 (会社名)	規格単位	成分名	用法・用量
7	注239 アロキシ静注0.75mg (大鵬薬品工業)	0.75mg5mL1瓶	パロノセトロン 塩酸塩	通常、成人にはパロノセトロンとして0.75mgを1日1回静脈内投与する。
(効能・効果) 抗悪性腫瘍剤 (シスプラチン等) 投与に伴う消化器症状 (悪心, 嘔吐) (遅発期を含む)				

薬効分類	銘柄名 (会社名)	規格単位	成分名	用法・用量
8	注392 ブリディオ静注200mg ブリディオ静注500mg (シェリング・プラウ)	200mg2mL1瓶 500mg5mL1瓶	スガマデクスナ トリウム	通常、成人にはスガマデクスとして、浅い筋弛緩状態 (筋弛緩モニターにおいて四連 (TOF) 刺激による2回目の収縮反応 (T <sub>2</sub> ) の再出現を確認した後) では1回2mg/kgを、深い筋弛緩状態 (筋弛緩モニターにおいてポスト・テタニック・カウント (PTC) 刺激による1~2回の単収縮反応 (1-2 PTC) の出現を確認した後) では1回4mg/kgを静脈内投与する。また、ロクロニウム臭化物の挿管用量投与直後に緊急に筋弛緩状態からの回復を必要とする場合、通常、成人にはスガマデクスとして、ロクロニウム臭化物投与3分後を目安に1回16mg/kgを静脈内投与する。
(効能・効果) ロクロニウム臭化物又はベクロニウム臭化物による筋弛緩状態からの回復				

薬効分類	銘柄名 (会社名)	規格単位	成分名	用法・用量
9	注421 テモダール点滴静注用 100mg (シェリング・プラウ)	100mg 1瓶	テモゾロミド	下記のとおり本剤を90分間かけて静脈内投与する。
<p>1. 初発の場合： 放射線照射との併用にて、通常、成人ではテモゾロミドとして75mg/m<sup>2</sup> (体表面積) を1日1回42日間投与し、4週間休薬する。 その後、本剤単独にて、テモゾロミドとして150mg/m<sup>2</sup> (体表面積) を1日1回5日間投与し、23日間休薬する。この28日を1クールとし、次クールでは1回200mg/m<sup>2</sup>に増量することができる。</p> <p>2. 再発の場合： 通常、成人ではテモゾロミドとして150mg/m<sup>2</sup> (体表面積) を1日1回5日間投与し、23日間休薬する。この28日を1クールとし、次クールで1回200mg/m<sup>2</sup>に増量することができる。</p>				
(効能・効果) 悪性神経膠腫				

(外用薬)

	薬効分類	銘柄名 (会社名)	規格単位	成分名	用法・用量
10	外131	ザラカム配合点眼液 (ファイザー)	1 mL	ラタノプロスト ・チモロールマ レイン酸塩	1回1滴、1日1回点眼する。
		(効能・効果) 緑内障、高眼圧症			