

(地Ⅲ252F)  
平成24年3月26日

都道府県医師会  
郡市区医師会  
感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会感染症危機管理対策室長  
保坂 シゲリ

### ポリオ（急性灰白髄炎）の予防接種の状況調査結果、ポリオワクチンに関する広報及び急性弛緩性麻痺患者の正確な診断に係る周知について

ポリオワクチンの接種に関する周知については、平成23年10月6日付文書（地Ⅲ146）等をもってご連絡申し上げてきたところです。

今般、昨年厚生労働省が実施したポリオ（急性灰白髄炎）の予防接種の状況調査結果の速報値がまとめられましたこと、昨年末から不活化ポリオワクチンについて順次国内導入のための申請（薬事承認申請）が行われていること等を受け、添付のとおり厚生労働省より各都道府県衛生主管部（局）に対して標記の事務連絡が発出され、本会にも情報提供がありましたのでご連絡申し上げます。

今回の事務連絡および添付資料では、上記調査の速報値で平成23年度のポリオワクチンの接種率が対前年度で下がっていることを受け、現行のポリオワクチン接種の必要性をあらためて示すとともに、不活化ポリオワクチンについては薬事承認申請が順次行われている状況に鑑み、本年（平成24年）秋の導入を目指すことを示しています。

また、医療機関に対しましては、急性弛緩性麻痺患者の診療に際して、ポリオの可能性を念頭に置くとともに、ポリオ患者の発生の際には感染症法に基づく届出を直ちに行うことを依頼しております。

つきましては、本事務連絡の内容について貴会会員に対し周知いただきたく、ご高配のほどよろしくお願ひ申し上げます。

事務連絡  
平成24年3月15日

各都道府県衛生主管部（局）御中

厚生労働省健康局結核感染症課

ポリオ（急性灰白髄炎）の予防接種の状況調査結果、ポリオワクチンに関する広報及び急性弛緩性麻痺患者の正確な診断に係る周知について（依頼）

日頃より、予防接種行政につきまして、ご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

先般、貴管下市町村における昨秋の生ポリオワクチンの接種率の調査をお願いしたところですが、調査結果（速報）をとりまとめましたので、情報提供いたします。詳細な結果につきましては、取りまとめ次第、情報提供を行う予定です。

ポリオワクチンの接種については、平成23年10月4日付け当課課長通知「ポリオワクチンの接種に関する広報について」（健感発第1004第1号）により、貴管下市町村等を通じて、国民の皆様に対して正確な情報提供に努めていただくようお願いしているところですが、今般、別添のとおり普及啓発用のリーフレットと、ポリオに関するQ&Aを改定いたしました。引き続き、貴管下市町村等を通じて、国民の皆様に対して正確な情報提供に努めていただくようお願い申し上げます。また、厚生労働省のホームページでも、随時更新を行い、情報提供を行っておりますので、あわせてご活用ください。

不活化ポリオワクチンの導入まで、ポリオワクチンの接種を見合わせることにより、ポリオに対する免疫を持たない人が増え、国内でポリオの流行が起こってしまう危険性が指摘されております。貴管下医療機関に対し、急性弛緩性麻痺患者の診療の際には、ポリオである可能性も念頭におき、ポリオ患者が発生した場合には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により、直ちに届出を行っていただくよう、改めて周知をお願いいたします。

厚生労働省ホームページ

予防接種情報のホームページ


[http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryou/kenkou/kekka\\_ku-kansenshou/influenza/kekakku-kansenshou20/](http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekka_ku-kansenshou/influenza/kekakku-kansenshou20/)

ポリオワクチンのホームページ

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/polio/>

## ポリオ生ワクチン予防接種の接種率の推移

(春・秋シーズンのみに接種を行う市町村における接種率の全国平均:平成21~23年度)



※平成23年度に春・秋シーズンのみに接種を行った市町村について、集計対象期間(春:4~8月、秋:9~12月)の接種者数を集計した。(有効回答市区町村数:1,282)

なお、通年で接種を実施する等の市町村については、平成23年度の接種が12月までに完了していないことから、本集計の対象としていない。

※対象者数は、各年度の10月1日時点の各市町村の人口を基準として、 $\langle (0\text{歳の}9/12 + 1\text{歳の}6/12) \times 12/15 \rangle$ として算定。

※本集計対象市町村の対象者数、接種者数は、以下のとおり

(単位:万人)

	春シーズン(4~8月)		秋シーズン(9~12月)	
	対象者数	接種者数	対象者数	接種者数
平成21年度	84.1	79.1	84.1	70.2
平成22年度	83.2	82.7	83.2	75.6
平成23年度	82.5	69.0	82.5	62.4

## ポリオの予防には、

# ポリオワクチンの接種が必要です。

不活化ポリオワクチンの導入は、  
2012(平成24)年の秋を目指しています。

- ◆不活化ポリオワクチンは、昨年末から順次、国内導入のための申請（薬事承認申請）が行われ、現在、薬事審査や供給の準備などが進められています。
- ◆不活化ポリオワクチンを可能な限り迅速に導入できるよう取り組んでおり、2012（平成24）年の秋の導入を目指しています。

不活化ポリオワクチンの導入まで、  
ポリオワクチンの接種を待つことは、おすすめできません。

- ◆ポリオの流行のない社会を保つためには、ワクチンの接種が必要です。
- ◆不活化ポリオワクチンを導入するまで、ポリオワクチンを接種せずに様子をみる人が増えると、免疫をもたない人が増え、国内でポリオの流行が起こってしまう危険性があります。

ポリオワクチンを接種することが、  
ポリオを予防する唯一の方法です。

- ◆日本では、2000年にポリオの根絶を報告しましたが、世界には、今でも流行している地域があり、渡航者などを介して感染はどの国にも広がる可能性があります。
  - パキスタン、アフガニスタンなどの南西アジア、ナイジェリアなどのアフリカ諸国では、今でも流行がみられます。
  - いったんポリオが根絶された中国やタジキスタンなどでも、最近流行が起ったことが報告されています。
- ◆このため、ポリオの根絶に向けて、世界中でワクチンの接種が行われています。
  - きちんとワクチンを接種し、ほとんどの人が免疫をもてば、海外でポリオが流行しても、国内での流行を防ぐことができます。

# ポリオの予防には、ポリオワクチンの接種が必要です。

できるだけ早く、  
不活化ポリオワクチンへ切り替えられるよう  
取り組んでいます。

◆生ポリオワクチンには、ごくまれにですが、接種の後、手足などに麻痺（まひ）を起こす場合があることが知られています。

○「生ワクチン」はウイルスの病原性を弱めてつくったワクチン、「不活化ワクチン」はウイルスを不活化して（＝殺して）つくったワクチンです。

○麻痺を起こした事例は、最近では

・生ワクチンを接種した人では、10年間で15例（100万人の接種当たり約1.4人に相当）

・周囲の人では、5年間で1例（いわゆる「2次感染」）

が認定されています。

◆複数の企業によって不活化ポリオワクチンの開発が進められています。実際に人に接種して安全性や有効性を確認する「治験（ちけん）」が行われ、一部の企業のワクチンは、既に治験を終えて承認申請が行われました。承認申請があったワクチンについては、薬事審査や供給の準備などが進められています。

○ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオの4種を混合したワクチン（DPT-IPV）と不活化ポリオ単独のワクチンの導入に向けた準備が進んでいます。

◆厚生労働省では、不活化ポリオワクチンを国内に導入する際には、できるだけ速やかに定期接種として広く実施できるよう、生ワクチンからの移行の方法などの検討を始めています。

生ポリオワクチンの接種を受けた後は、  
手洗いなどに気をつけましょう。

◆生ポリオワクチンを接種してから1か月程度は、ウイルスが便の中に出ています。

○特に初回接種の後1～2週間に、便中のウイルス量が最大になるという報告もあります。

◆この期間、おむつ交換の後などには十分に手を洗うなどして、便の中のウイルスが他の人の口に入らないように気をつけ、感染の危険性を少しでも小さくしましょう。

◆また、生ポリオワクチンの2次感染を防ぐには、地域内のすべての乳児が一齊に接種を受けるのが、最も安全性の高い方法です。お住まいの市町村がご案内する時期に接種を受けることをおすすめします。

【 ポリオワクチンに関する情報は、厚生労働省ホームページでご案内しています。】

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/polio/index.html>

## ポリオワクチンに関する Q&amp;A

平成 24 年3月15日版

**問1. ポリオってどんな病気ですか？****問2. 生ポリオワクチンと不活化ワクチンはどう違うのですか？****問3. 生ポリオワクチンによる麻痺はどのくらい発生しているのですか？****問4. ポリオワクチンを接種していないと、ワクチンを接種した子から感染してポリオになることがあると聞きました。どうすればよいのでしょうか。****問5. 日本ではもうポリオは発生していないのに、ポリオワクチンの接種が必要なのですか？****問6. 不活化ポリオワクチンに切り替わるのはいつ頃ですか？****問7. 不活化ワクチンに切り替わるまでの間、接種しないで待っていたほうがよいのですか？****問8. 平成 24 年の春に生ポリオワクチンの接種を1回受ける予定ですが、次の接種はどうなりますか？****問1. ポリオってどんな病気ですか？****・ポリオは、人から人へ感染します。**

ポリオは、ポリオウイルスが人の口の中に入り、腸の中で増えることで感染します。

増えたポリオウイルスは、再び便の中に排泄され、この便を介してさらに他の人に感染します。成人が感染することもありますが、乳幼児がかかることが多い病気です。

**・ポリオウイルスに感染すると、手や足に麻痺があらわれることがあります。**

ポリオウイルスに感染しても、多くの場合、病気としての明らかな症状はあらわれずに、知らない間に免疫ができます。

しかし、腸管に入ったウイルスが脊髄の一部に入り込み、主に手や足に麻痺があらわれ、その麻痺が一生残ってしまうことがあります。

麻痺の進行を止めたり、麻痺を回復させるための治療が試みられてきましたが、残念ながら、現在のところ、特効薬などの確実な治療法はありません。麻痺に対しては、残された機能を最大限に活用するためのリハビリテーションが行われます。

## 問2. 生ポリオワクチンと不活化ポリオワクチンはどう違うのですか？

### ・生ポリオワクチンには、病原性を弱めたウイルスが入っています。

「生ワクチン」は、ポリオウイルスの病原性を弱めてつくったものです。ポリオにかかったときとほぼ同様の仕組みで強い免疫ができます。免疫をつける力が優れている一方で、まれにポリオにかかったときと同じ症状が出ることがあります（問3参照）。その他、麻しん（はしか）、風しん（三日ばしか）のワクチン、結核のBCGが生ワクチンです。

### ・不活化ワクチンは、不活化した（殺した）ウイルスからつくられています。

「不活化ワクチン」は、ポリオウイルスを不活化し（＝殺し）、免疫をつくるのに必要な成分を取り出して病原性を無くしてつくったものです。ウイルスとしての働きはないので、ポリオと同様の症状が出るという副反応はありません（ただし、発熱など、不活化ワクチンにも副反応はあります）。その他、百日せき、日本脳炎のワクチンが不活化ワクチンです。

## 問3. 生ポリオワクチンによる麻痺はどのくらい発生しているのですか？

### ・ポリオの予防接種を受けた人の中には、ポリオにかかった時と同じような麻痺を生じことがあります。

現在、日本国内で（公費での）予防接種に使っているワクチンは生ポリオワクチンです。入っているウイルスは病原性を弱めているとはいえ生きていますから、ウイルスが変化するなど何らかの要因で、ポリオにかかった時と同じように、手や足に麻痺があらわれることがまれにあります。

### ・ポリオの予防接種を受けた人の中で、ポリオによる麻痺の可能性があると認定されたのは、10年間で15人（100万人への接種当たり約1.4人）です。

ポリオの予防接種を受けた人の中で、予防接種健康被害救済制度に申請し、ポリオによる麻痺と認定された人数は、2001（平成13）年度～2010（平成22）年度の10年間で、15人です。日本では、1年に概ね110万人がポリオの予防接種を受けていることから、100万人の接種当たり約1.4人に相当します。

## 問4. ポリオワクチンを接種していないと、ワクチンを接種した子から感染してポリオになることがあると聞きました。どうすればよいのでしょうか。

### ・極めてまれですが、生ワクチンの接種を受けた人の周囲の人が、ポリオになることがあります。

予防接種を受けた人と接触した人の中にも、ポリオと同じ様な麻痺などの症状があらわれることがあります。これは、生ポリオワクチンに含まれるウイルスが予防接種を受けた人の便の中に出で、周囲の人に感染したことによるものです。このような2次感染は、2006(平成 18)年度～2010(平成 22)年度の間に日本全国で1人の報告がありました。ポリオの予防接種を受けていないご家族など、ポリオウイルスに対する免疫を持っていない人は、ウイルスに感染する可能性が高く、麻痺の症状が現れる可能性がより高いと考えられます。

・生ワクチンの予防接種を受けて1カ月程度は、ウイルスが感染しないよう乳児の便の処理などに細心の注意を払いましょう。

予防接種を受けてから1カ月程度はウイルスが便の中に出ています。特に初回接種の後1～2週間目に、便中のウイルス量は最大になるという報告もあります。この期間、おむつ交換の後などには十分に手を洗うなどして、便の中のウイルスが他の人の口に入らないよう気をつけ、感染の危険を少しでも小さくすることをおすすめします。

また、生ポリオワクチンからの2次感染を防ぐには、地域内の全ての乳児が一斉に接種を受けるのが、最も安全性の高い方法です。お住まいの市町村がご案内する時期に接種を受けることをおすすめします。

## 問5. 日本ではもうポリオは発生していないのに、ポリオワクチンの接種が必要なのですか？

・予防接種によってポリオの大流行を防ぐことができました。

日本では、1960(昭和 35)年に、ポリオ患者の数が5千人を超え、かつてない大流行となりましたが、生ポリオワクチンの導入により、流行はおさまりました。1980(昭和 55)年の1例を最後に、現在まで、野生の(ワクチンによらない)ポリオウイルスによる新たな患者はありません。

・今でも、海外から、ポリオウイルスが国内に入ってくる可能性があります。

海外では依然としてポリオが流行している地域があります。パキスタンやアフガニスタンなどの南西アジア、ナイジェリアなどのアフリカ諸国です。また、これらの国の患者からの感染により、タジキスタン、中国など他の国でも発生したという報告があります。

ポリオウイルスに感染しても、麻痺などの症状が出ない場合が多いので、海外で感染したこと気につかないまま帰国(あるいは入国)してしまう可能性があります。症状がなくても、感染した人の便にはポリオウイルスが排泄され、感染のもととなる可能性があります。

・ポリオに対する免疫をもつ人の割合が減ると、流行する危険があります。

仮に、ポリオウイルスが日本国内に持ち込まれても、現在では、ほとんどの人が免疫を持っているので、大きな流行になることはないと考えられます。シンガポール、オーストラリアなど、予防接種率が高い国々では、ポリオの流行地からポリオ患者が入国しても、国内でのウイルスの広がりがなかったことが報告されています。しかし、予防接種を受けない人が増え、免疫をもつ人の割合が減ると、持ち込まれたポリオウイルスは免疫のない人から人へと感染し、ポリオの流行が起こる可能性が増加します。

## 問6. 不活化ポリオワクチンに切り替わるのはいつ頃ですか？

・不活化ポリオワクチンの導入は、2012(平成 24)年の秋を目指しています。

複数の企業によって不活化ポリオワクチンの開発が進められています。実際に人に接種して安全性や有効性を確認する「治験(ちけん)」が行われ、一部の企業では、既に治験を終えて承認申請が行われました。現在、薬事審査や供給の準備などが進められています。不活化ポリオワクチンを可能な限り迅速に導入できるよう取り組んでおり、2012(平成 24)年の秋の導入を目指しています。ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオワクチン(DPT-IgV)と単独の不活化ポリオワクチンの導入に向けた準備が進められています。

・厚生労働省では、不活化ポリオワクチンへ円滑に移行するための準備にとりかかっています。

不活化ポリオワクチンが国内で導入された場合には、できるだけ速やかに、予防接種法に基づく定期接種として実施したいと考えています。生ワクチンから不活化ポリオワクチンに円滑に移行できるよう、厚生労働省では、昨年8月に「不活化ポリオワクチンへの円滑な移行に関する検討会」を設置し、移行の方法などの検討を始めています。

## 問7. 不活化ワクチンに切り替わるまでの間、接種しないで待っていたほうがよいのですか？

・今でも、海外からポリオウイルスが国内に入ってくる可能性があります。

海外では依然としてポリオが流行している地域があります。パキスタンやアフガニスタンなどの南西アジア、ナイジェリアなどのアフリカ諸国です。また、これらの国の患者からの感染により、タジキスタン、中国など他の国でも発生したという報告があります。

ポリオウイルスに感染しても、麻痺などの症状が出ないので、海外で感染して

も感染したことに気がつかないまま帰国(あるいは入国)してしまう可能性があります。症状がなくても、感染した人の便にはポリオウイルスが排泄されて、感染のもととなる可能性があります。

・不活化ポリオワクチンの導入まで、ポリオワクチンの接種を待つことはおすすめできません。

不活化ポリオワクチンが導入されるまで、ポリオワクチンを接種せずに様子をみる人が増えると、免疫をもたない人が増え、国内でポリオの流行が起こってしまう可能性が増加します。ポリオ流行のない社会を保つためには、ワクチンの接種が必要です。

生ポリオワクチンの2次感染を防ぐには、地域内で全ての乳児が一斉に接種を受けるのが、最も安全性の高い方法です。お住まいの市町村がご案内する時期に接種を受けることをおすすめします。

**問8. 平成24年の春に生ポリオワクチンの接種を1回受ける予定ですが、次の接種はどうなりますか？**

・既に生ポリオワクチンを1回接種をした方の不活化ポリオワクチン導入後の接種については、研究結果を踏まえて検討する予定です。

海外では、不活化ポリオワクチンに切り替えたときに、既に生ポリオワクチンを1回接種した人に対して、途中から不活化ポリオワクチンに切り替えて接種を行った場合でも、免疫がつく効果が得られたとの報告があります。

国内でも、生ワクチンを1回接種した後に不活化ポリオワクチンを接種した場合に免疫がつくかどうかを調べるための臨床研究を進めています。その結果などを踏まえ、「不活化ポリオワクチンへの円滑な移行に関する検討会」で、生ポリオワクチンを1回接種した方が、不活化ポリオワクチンの導入後にどうすればよいか検討し、皆様にお知らせする予定です。